

ANNEXE 1

LISTE DES ESPECES INDIGENES ELIGIBLES POUR LA PLANTATION DES HAIES

**LEGENDE DES PREFERENCES OU EXIGENCES PAR RAPPORT AUX SOLS**

ca : à réserver aux sols calcarifères  
 ac: à réserver aux sols acides  
 hy : à réserver aux sols frais à humides  
 x : convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence

NOM	Préférences ou exigences
1. Aubépine à un style ( <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.)	
2. Aubépine à deux styles ( <i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.)	
3. Aulne glutineux ( <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.)	hy
4. Bouleau pubescent ( <i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	(ac) (hy)
5. Bouleau verruqueux ( <i>Betula pendula</i> Roth)	
6. Bourdaine ( <i>Frangula alnus</i> Mill.)	
7. Cerisier à grappes ( <i>Prunus padus</i> L.)	(ac)
8. Charme ( <i>Carpinus betulus</i> L.)	
9. Châtaignier ( <i>Castanea sativa</i> Mill.)	ac
10. Chêne pédonculé ( <i>Quercus robur</i> L.)	
11. Chêne sessile ( <i>Quercus petraea</i> Lieblein)	
12. Cognassier ( <i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	
13. Cornouiller mâle ( <i>Cornus mas</i> L.)	ca
14. Cornouiller sanguin ( <i>Cornus sanguinea</i> L.)	(ca)
15. Eglantier ( <i>Rosa canina</i> L.)	
16. Erable champêtre ( <i>Acer campestre</i> L.)	(ca)
17. Erable plane ( <i>Acer platanoides</i> L.)	
18. Erable sycomore ( <i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	
19. Framboisier ( <i>Rubus idaeus</i> L.)	ac
20. Frêne commun ( <i>Fraxinus excelsior</i> L.)	
21. Fusain d'Europe ( <i>Evonymus europaeus</i> L.)	(ca)
22. Genêt à balais ( <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	ac
23. Griottier ( <i>Prunus cerasus</i> L.)	
24. Groseillier à maquereaux ( <i>Ribes uva-crispa</i> L.)	(ca)
25. Groseillier noir ou cassis ( <i>Ribes nigrum</i> L.)	hy
26. Groseillier rouge ( <i>Ribes rubrum</i> L.)	(ca) (hy)
27. Hêtre commun ( <i>Fagus sylvatica</i> L.)	
28. Houx ( <i>Ilex aquifolium</i> L.)	(ac)
29. Merisier ( <i>Prunus avium</i> L.)	

NOM	Préférences ou exigences
30. Myrobolan ( <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.)	
31. Néflier ( <i>Mespilus germanica</i> L.)	ac
32. Nerprun purgatif ( <i>Rhamnus cathartica</i> L.)	(ca) (x)
33. Noisetier ( <i>Corylus avellana</i> L.)	
34. Noyer commun ( <i>Juglans regia</i> L.)	(ca)
35. Orme champêtre ( <i>Ulmus minor</i> Mill.)	
36. Orme de montagne ( <i>Ulmus glabra</i> Huds.)	
37. Peuplier blanc ( <i>Populus alba</i> L.)	(hy)
38. Peuplier grisard ( <i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith)	(hy)
39. Peuplier tremble ( <i>Populus tremula</i> L.)	
40. Poirier cultivé ( <i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i> )	
41. Pommier commun ( <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.)	
42. Pommier sauvage ( <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i> )	
43. Prunellier ( <i>Prunus spinosa</i> L.)	(x)
44. Prunier crèpe ( <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens)	(ca)
45. Robinier ( <i>Robinia pseudoacacia</i> L.)	
46. Ronce bleue ( <i>Rubus caesius</i> L.)	(ca)
47. Saule à oreillettes ( <i>Salix aurita</i> L.)	hy
48. Saule à trois étamines ( <i>Salix triandra</i> L.)	(hy)
49. Saule blanc ( <i>Salix alba</i> L.)	(hy)
50. Saule cendré ( <i>Salix cinerea</i> L.)	hy
51. Saule des vanniers ( <i>Salix viminalis</i> L.)	(hy)
52. Saule fragile ( <i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec <i>S. alba</i> ( <i>S. xrubens</i> Schrank)	(hy)
53. Saule marsault ( <i>Salix caprea</i> L.)	
54. Saule pourpre ( <i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch)	(hy)
55. Sorbier des oiseleurs ( <i>Sorbus aucuparia</i> L.)	(ac)
56. Sureau à grappes ( <i>Sambucus racemosa</i> L.)	ac
57. Sureau noir ( <i>Sambucus nigra</i> L.)	(ca)
58. Tilleul à grandes feuilles ( <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	(ca)
59. Tilleul à petites feuilles ( <i>Tilia cordata</i> Mill.)	(x)
60. Troène commun ( <i>Ligustrum vulgare</i> L.)	ca x
61. Viorne lantane ( <i>Viburnum lantana</i> L.)	ca x
62. Viorne obier ( <i>Viburnum opulus</i> L.)	

Remarques :

1. On évitera les provenances "exotiques" pour ces ligneux, de même que les cultivars. A ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessus car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement.
2. Dans le cas du poirier, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques seront privilégiées.
3. L'if (*Taxus baccata*) et le buis (*Buxus sempervirens*), qui sont deux espèces indigènes (mais à répartition limitée en Wallonie) convenant bien en principe pour la confection de haies, ont été écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme.